

Liebe Patientin, lieber Patient!

018859/5000 GP

DE

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

# Tartephedreel® N

## Mischung

**Zusammensetzung:** 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium stibyltartaricum Dil. D4 1,0 g, Atropa belladonna Dil. D4 1,0 g, Natrium sulfuricum Dil. D4 1,0 g, Arsenum jodatum Dil. D6 1,0 g, Blatta orientalis Dil. D6 0,5 g, Lobelia inflata Dil. D4 0,5 g, Cephaelis ipecacuanha Dil. D4 0,5 g, Naphthalinum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 0,5 g, Anisum stellatum (HAB 34) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 4a) 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die vorletzte Stufe mit Ethanol 62% (G/G) und über die letzte Stufe mit Ethanol 43% (G/G).

Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.

Mischung 30, 100 ml

**Indikationsgruppe:** Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden

Telefon: 0 72 21/501-00, Fax: 0 72 21/501-690

**Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der Atemwege.

Bei länger anhaltenden Beschwerden, sowie bei Atemnot, Fieber, eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden

**Gegenanzeigen:** Gegenanzeigen sind Krankheiten und Umstände, bei denen bestimmte Arzneimittel nicht angewendet werden dürfen. Diese sind nachfolgend aufgeführt:

*Wann dürfen Sie Tartephedreel N erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?* Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Tartephedreel N nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zuträfen.

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

**-Heel**



## **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?* Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zu Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?* Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden. Bei Schulkindern unter 12 Jahren soll das Arzneimittel nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?* Enthält 35 Vol.-% Alkohol.

**Wechselwirkungen:** Keine bekannt.

*Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?*

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Tartephedreel N nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Tartephedreel N sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel von Tartephedreel N und wie oft sollten Sie Tartephedreel N anwenden?* Soweit nicht anders verordnet, 3mal täglich 10 Tropfen einnehmen. Bei akuten Beschwerden initial mehrmals alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).

*Wie lange sollten Sie Tartephedreel N anwenden?* Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** *Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Tartephedreel N auftreten?* Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

**Stand der Information:** 12/2002

